


Aquest full ha de ser retornat al laboratori amb el pot d'orina.

Instruccions per a la recollida d'orina de 24 hores.

El laboratori li proporcionarà un pot d'orina gran i un pot petit amb àcid clorhídric (HCL). El dia abans d'anar al laboratori per entregar la mostra, en llevar-se, cal orinar normalment al WC. A partir d'aquest moment s'ha de recollir tota l'orina del dia, la de tota la nit i la primera de l'endemà. Recollir la primera orina directament al pot gran. Amb cura de no esquitxar-vos, aboqueu el contingut líquid del pot petit (HCL) sobre la primera orina en l'interior del recipient gran. Aneu recollint la resta de la mostra d'orina diària sobre el recipient gran (es preferible no orinar directament al pot, per evitar possibles esquitxades de l'àcid). Mentrestant, s'ha de guardar l'ampolla de 2 litres en un lloc fresc i airejat, tot el temps que duri la recollida. Si no cap tota l'orina en l'ampolla es posarà en una altre ampolla addicional, per tal de recollir-la tota. Si durant aquest període s'hagués de fer una deposició, s'ha d'intentar recollir l'orina abans, per tal d'evitar pèrdues. Cal tenir en compte que aquesta prova només té valor si es recull correctament tota l'orina.

RECOLLIDA D'ORINA DE 24 HORES

 Dia anterior d'anar al laboratori




Orinar al WC

 Durant la resta del dia



Recollir tota la orina al pot

 Dia d'anar al laboratori



Finalitzar la recollida

Comprovar que el pot està ben tapat

Entregar el pot, aquest full i la petició a recepció de mostres del laboratori (edifici UDIAT), de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.



Condicions prèvies a la recollida

Durant els dos o tres dies previs a la recollida de mostra d'orina per determinació de catecolamines i metanefrines s'ha d'evitar el consum de:

- Alcohol
- Cafè
- Te
- Tabac

Marqui amb una creu els fàrmacs que consumeix habitualment

Àcid acetil salicílic i salicilats		Altres fàrmacs (Especifiqui)	
Adrenalina			
Antidepressius tricíclics			
Bromocriptina			
Contrasts iodats			
Clofibrato			
Clonidina			
Dexametasona			
Diürètics			
Fenotiacines			
Guanetidina			
Hipotensors			
IMAO			
Labetalol			
Levodopa			
Marihuana			
Nicotina			
Nitroglicerina			
Oubaína			
Reserpina			
Tetraciclines			
Teofil·lina			

Esta hoja debe entregarse en el laboratorio con el bote de orina.


Instrucciones para la recogida de orina de 24 horas

El laboratorio le proporcionará un bote de orina grande y un bote pequeño con ácido clorhídrico (HCL). El día antes de ir al laboratorio para entregar la muestra, nada más levantarse, hay que orinar normalmente al WC. A partir de este momento hay que recoger toda la orina del día, la de toda la noche y la primera del siguiente día. Recoger la primera orina directamente sobre el bote grande. Con cuidado de no salpicarse, volcar el contenido del bote pequeño (HCL) sobre la primera orina que está en el bote grande. Recoger el resto de muestras de orina del día en el recipiente grande (es preferible no orinar directamente en el bote, para evitar posibles salpicaduras del ácido). Mientras tanto, se debe guardar el bote de 2 litros en un sitio fresco y aireado, todo el tiempo que dure la recogida. Si no cabe toda la orina en el bote se pondrá en un otro bote adicional, para poder recogerla toda. Si durante este tiempo se tuviese que hacer una deposición, se debe intentar recoger la orina antes, para evitar pérdidas. Hay que tener en cuenta que esta prueba sólo tiene valor si se recoge correctamente toda la orina.

RECOGIDA DE ORINA DE 24 HORAS




Día antes de ir al laboratorio



Orinar en el WC




Durante todo el día



Recoger toda la orina en el bote



Día de ir al laboratorio



Finalizar la recogida

Comprobar que el bote esté bien tapado

Entregar el bote, esta hoja y la petición en la recepción de muestras del laboratorio (edificio UDIAT), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.



Condiciones previas a la recogida

Durante los dos o tres días previos a la recogida de muestra de orina para la determinación de catecolaminas y metanefrinas hay que evitar el consumo de:

- Alcohol
- Café
- Té
- Tabaco

Marque con una cruz los fármacos que consume habitualmente

Ácido acetyl salicílico y salicilatos		Otros fármacos (Especifique)	
Adrenalina			
Antidepresivos tricíclicos			
Bromocriptina			
Contrastes iodados			
Clofibrato			
Clonidina			
Dexametasona			
Diuréticos			
Fenotiacinas			
Guanetidina			
Hipotensores			
IMAO			
Labetalol			
Levodopa			
Marihuana			
Nicotina			
Nitroglicerina			
Ouabaína			
Reserpina			
Tetraciclinas			
Teofilina			